

EIG en pratique chirurgicale sur une chienne : nécrose jéjunale après ovariectomie

par le Dr Vre Michel Baussier



Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Stérilisation précoce (pré-pubertaire)	Oui	<i>Non, au contraire ; aurait plutôt pu réduire le risque</i>
Chirurgien détendu et reposé	Non : planning surchargé, vétérinaire stressé et fatigué	Très importante
Ovariectomie réalisée selon les règles de l'art (ligatures précautionneuses du pédicule ovarien et de la jonction ovario-tubaire).	Non	Oui, essentielle
Barrières de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Examen attentif des pédicules après section pour rattrapage chirurgical	Non, une laparotomie réduite (3 cm) ne facilite pas cet examen	Oui
Barrières d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Hospitalisation, mise en place du diagnostic de la cause	Oui Mais pas conduite à terme, faute de temps	Non

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Même si l'erreur, ici fautive, est purement technique, elle est pourtant le fait d'un praticien expérimenté, habituellement habile, avisé et sûr de son art.	Ne peut être écartée
Défauts de compétences non techniques du praticien	Souci et désir d'aller vite (trop vite), stress d'un emploi du temps surchargé, fatigue et inattention.	Très probablement déterminante

Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de l'espèce	Difficulté anatomique propre à l'espèce canine (pédicule court et bourse ovarique).	Possible
Tempo de l'intervention	La banalisation de la stérilisation chirurgicale peut contribuer, par installation dans une routine, à la diminution de la précision du geste opératoire.	À peu près certain dans ce cas mais reste à considérer de façon générale.
Tempo du propriétaire (éléments liés à son comportement)	Aucun fait susceptible d'interaction négative.	Non
Tempo du praticien	<ul style="list-style-type: none"> • Expérimenté mais surchargé et pressé, devenu insuffisamment attentif. • Fatigué et stressé. • Routinier et anormalement optimiste. • Choix d'une laparotomie étroite peu propice à la sécurité des gestes opératoires. 	Majeure
Tempo de l'établissement de soins vétérinaires et du système de soins	Incidence vraisemblable par surcharge du planning.	Oui